



100% MALTODEXTRINA
LIVRE DE ALERGÊNIOS
SEM SABOR

UMA DOSE
EXTRA DE
ENERGIA PARA
O DIA-A-DIA!

O período que antecede uma cirurgia quando acompanhado de um jejum prolongado pode ocasionar um estresse que leva o corpo a piorar condições clínicas como a resistência a insulina e um maior tempo de hospitalização.

A boa notícia é que a ingestão de carboidratos até 2 horas antes da cirurgia traz muitos benefícios para o pós-operatório.

CarboCH é a solução ideal, apenas 1 sachê atende a essa recomendação.

- **CarboCH** é ideal para abreviar o jejum pré-cirúrgico
- Também pode ser consumido para dar mais energia para as atividades diárias

REFERÊNCIAS: Aguilar-Nascimento José Eduardo de, et al. Rev Col Bras Cir. 44, 2017, Vol. (6), 633-648. ESPEN. Clinical Nutrition. 36, 2017, Vols. 623 - 650. Gustafsson, U O et al. Clinical Nutrition. 31, 2012, Vols. 783-800. Andressa dos Santos Pinto, et al. ABCD Arq Bras Cir Dig. 28, 2015, Vol. (1), 70-73. Dawson A; Maturitas 2016; 93: 13-17. Bauer J et al. J Am Med Dir Assoc. 2013 Aug;14(8):542-59. Epub 2013 Jul 16. Gonçalves et al. BRASPEN J 2019; 34 (Supl 3): 2-58. Marshall, K. Alternative Medicine Review. 2004; 9:2. Kanda A et al. Nutrients 2016; 8 (6): 339. Phillips SM. Nutr Metab (Lond). 2016 Sep 29;13:64. eCollection 2016. Tang JE, Phillips SM. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2009;12:66e71. Burd NA, et al. J Nutr 2011; 141:568e573. Pennings B et al. Am J Clin Nutr 2011;93:997e1005. Dangin M et al. J Nutr 2002;132: 3228Se32335.